



CRUZ AZUL

Av. Lins de Vasconcelos, 356 - Cambuci
CEP 01538-900 - São Paulo - SP
Tel. 11 3348-4000
www.cruzazulsp.com.br

 @HospitalCruzAzul

 /HospitalCruzAzulSP

Responsável Técnico:
Dr. Nelson Rodrigues Junior
CRM 42.188

A.ENF.0570 - V1



ORIENTAÇÕES PARA CURATIVO CIRÚRGICO PÓS-ALTA



CURIOSIDADE

As feridas operatórias, geralmente, saem da fase inflamatória de 48 a 96 horas após a cirurgia, e levam, em média, mais 10 dias para completar totalmente o processo de cicatrização, por isso, durante esse período devem permanecer ocluídas para proteção.

ORIENTAÇÕES GERAIS

Neste período:

- Proteja o curativo durante o banho com saco plástico ou filme de cozinha.
- Retire o curativo após o banho, caso esteja aderido na ferida, pingue algumas gotas de soro fisiológico no curativo, ele soltará mais facilmente.
- Inrrigue a ferida com soro fisiológico e passe a gaze inúmeras vezes em cima da ferida, até verificar que a gaze esteja totalmente limpa, somente molhada com soro fisiológico.
- Segure a gaze encosando nas 4 pontas, deixando apenas o meio para contato com a ferida.
- Não tenha medo o objetivo é ficar bem limpo.

POR QUE A UTILIZAÇÃO DO SORO FISIOLÓGICO?

O soro fisiológico tem sua fabricação e envasamento controlados, ou seja, podemos acreditar que não existem microorganismos nele, ao contrário da água do encanamento, já que não existe nenhuma legislação ou fiscalização para a limpeza dos encanamentos ou caixas domiciliares, por isso que há a recomendação de que a limpeza seja feita com o soro fisiológico.

TROCA DO CURATIVO

- Seque a pele ao redor da ferida com gazes.
- Aplique _____
- Oclua a ferida com gaze seca e micropore.

É no momento da troca do curativo que se deve observar a ferida para sinais que possam indicar infecção, se presentes deve-se procurar o médico cirurgião e/ou a equipe responsável pela cirurgia.

Após este período, se não houver sinal nenhum, a ferida pode ficar descoberta e o banho sem proteção.

IMPORTANTE

Sinais de que a ferida operatória requer avaliação e manejo de profissionais:

- Pele avermelhada;
- Saída de secreção;
- Tecido preto ou amarelo persistente;
- Pele afastada;
- Dor forte.

