

## ORIENTAÇÃO – BCG

### **Mãe acompanhe a evolução da cicatrização vacinal do seu (a) filho (a)**

#### **VACINA BCG – EVOLUÇÃO NORMAL DA LESÃO VACINAL**

A vacina BCG é realizada na inserção inferior do músculo deltóide do braço direito.

Da 1<sup>a</sup> à 2<sup>a</sup> semana: mácula (mancha) avermelhada.

Da 3<sup>a</sup> à 4<sup>a</sup> semana: vesícula na pele com pústula (pus) e formação de uma crosta (casquinha)

Da 4<sup>a</sup> à 5<sup>a</sup> semana: úlcera (ferida) com 4 a 10 mm de diâmetro.

Da 6<sup>a</sup> à 12<sup>a</sup> semana: cicatriz com 4 a 7 mm de diâmetro, encontrada em cerca de 95% dos vacinados.

O tempo dessa evolução é de seis a doze semanas, podendo prolongar-se raramente até a 24<sup>a</sup> semana.

#### **CUIDADOS COM O LOCAL DA APLICAÇÃO DA VACINA**

Não colocar curativo no local; não passar qualquer medicamento e/ou pomada no local; apenas lavar com água e sabão e secar bem o local da aplicação.

No caso de dúvida ou qualquer anormalidade no local da aplicação, procurar um Posto de Saúde mais próximo da sua residência.

Proteja seu filho (a) através da vacinação, leve-o ao Posto de Saúde mais próximo de sua residência para receber **gratuitamente** as vacinas do calendário básico de vacinação de São Paulo.

#### **IMPORTANTE**

Todas as crianças menores de cinco anos de idade deverão participar das **Campanhas Nacionais de Vacinação**, mesmo que sua vacinação esteja completa, sendo tal conduta recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria na Imunização das Crianças, além de protegê-lo você prestará grande contribuição à Saúde Pública, ajudando a combater a entrada do vírus selvagem no Brasil, o vírus da **Poliomielite**, que ainda existe em alguns Países, e só através das Campanhas de Vacinação conseguirá eliminá-lo.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

A.UMN.0042 – V0



## ORIENTAÇÃO – BCG

### **Mãe acompanhe a evolução da cicatrização vacinal do seu (a) filho (a)**

#### **VACINA BCG – EVOLUÇÃO NORMAL DA LESÃO VACINAL**

A vacina BCG é realizada na inserção inferior do músculo deltóide do braço direito.

Da 1<sup>a</sup> à 2<sup>a</sup> semana: mácula (mancha) avermelhada.

Da 3<sup>a</sup> à 4<sup>a</sup> semana: vesícula na pele com pústula (pus) e formação de uma crosta (casquinha)

Da 4<sup>a</sup> à 5<sup>a</sup> semana: úlcera (ferida) com 4 a 10 mm de diâmetro.

Da 6<sup>a</sup> à 12<sup>a</sup> semana: cicatriz com 4 a 7 mm de diâmetro, encontrada em cerca de 95% dos vacinados.

O tempo dessa evolução é de seis a doze semanas, podendo prolongar-se raramente até a 24<sup>a</sup> semana.

#### **CUIDADOS COM O LOCAL DA APLICAÇÃO DA VACINA**

Não colocar curativo no local; não passar qualquer medicamento e/ou pomada no local; apenas lavar com água e sabão e secar bem o local da aplicação.

No caso de dúvida ou qualquer anormalidade no local da aplicação, procurar um Posto de Saúde mais próximo da sua residência.

Proteja seu filho (a) através da vacinação, leve-o ao Posto de Saúde mais próximo de sua residência para receber **gratuitamente** as vacinas do calendário básico de vacinação de São Paulo.

#### **IMPORTANTE**

Todas as crianças menores de cinco anos de idade deverão participar das **Campanhas Nacionais de Vacinação**, mesmo que sua vacinação esteja completa, sendo tal conduta recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria na Imunização das Crianças, além de protegê-lo você prestará grande contribuição à Saúde Pública, ajudando a combater a entrada do vírus selvagem no Brasil, o vírus da **Poliomielite**, que ainda existe em alguns Países, e só através das Campanhas de Vacinação conseguirá eliminá-lo.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

A.UMN.0042 – V0