

VACINA BCG – EVOLUÇÃO NORMAL DA LESÃO VACINAL

A vacina BCG contra tuberculose é realizada na inserção inferior do músculo deltóide do braço direito.


- Da 1ª a 2ª semana: mácula (mancha) avermelhada;
- Da 3ª a 4ª semana: vesícula na pele com pústula (pus) e formação de uma crosta (casquinha);
- Da 4ª a 5ª semana: úlcera (ferida) com 4 a 10mm de diâmetro;
- Da 6ª a 12ª semana: cicatriz com 4 a 7mm de diâmetro, encontrada em cerca de 95% dos vacinados.

O tempo dessa evolução é de seis a doze semanas, podendo prolongar-se raramente até a 24ª semana.

Cuidados com o local da aplicação da vacina

- Apenas lave com água e sabão, secando bem o local da aplicação;
- Não coloque curativo na área;
- Não passe qualquer medicamento e/ou pomada;
- Em caso de dúvida ou qualquer anormalidade no local da aplicação, procure o Posto de Saúde mais próximo da sua residência.





Atenção, pais e responsáveis: acompanhem a evolução da cicatrização vacinal das crianças!

IMPORTANTE

Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem participar das Campanhas Nacionais de Vacinação, mesmo que sua vacinação esteja completa, pois a imunização é recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Além de protegê-los, você prestará grande contribuição à saúde pública, ajudando a combater a entrada do vírus selvagem no Brasil, o vírus da Poliomielite, que ainda existe em alguns países e, somente por meio da vacinação será possível eliminá-lo.

Leve as crianças ao Posto de Saúde mais próximo de sua residência para receber gratuitamente as vacinas do calendário básico de vacinação de São Paulo.



CRUZ AZUL
Saúde e Educação

Av. Lins de Vasconcelos, 356 – Cambuci
CEP: 01538-900 – São Paulo – SP
(11) 3348-4000

www.cruzazulsp.com.br

 Cruzazuldesaopaulo